




TERRAMAY

www.terramay.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU





TERRAMAY

www.terramay.com.tr



”

iz

**Bırakan
Çözümler**

***Terramay Tarım olarak,
üreticilerimizin güvenini en
üst düzeyde tutarak ülkemizin
verimli topraklarına değer
katmaya devam ediyoruz.***






Sürdürülebilir tarımın önemli bir bileşeni olarak, çevreye duyarlı, kalıntısız ürünlerle çalışıyoruz ve geleceğe hazırlanıyoruz. Tarım, sürekli değişen dünyamızda doğal kaynaklarımızın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye ve dünyadaki nüfus artışı eğilimi ve uluslararası rekabet baskısı, güvenli gıda tedarikini ve sürdürülebilir tarımı daha da önemli hale getiriyor. Bilinçli beslenme, doğru toprak yönetimi ve sağlıklı bitki gelişimi için yenilikçi ürünlerimiz, tarımsal uzmanlar tarafından tercih ediliyor.

Uzun vadeli AR-GE çalışmalarımızla teknolojiyi en etkili şekilde kullanarak, üreticilerimize en başarılı sonuçları sunuyoruz.

Toprak, bitki, çevre ve insan sağlığına olumlu katkılar sağlıyoruz.



TERRAMINO

Hayvansal Menşeli Amino Asit İçeren
Sıvı Organik Gübre

Liquid Organic Fertilizer Of Animal
Based Aminoacid

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	% 60
Organik Karbon	% 27
Organik Azot (N)	% 9
Serbest Aminoasitler	% 12
pH	5,5 - 6,5
GUARANTEED CONTENT	%W/W
Organic Substance	% 60
Organic Carbon	% 27
Organic Nitrogen (N)	% 9
Free Amino Acids	% 12
pH	5,5 - 6,5



Ürün / Product	Uygulama Zamanı ve Dozu / Application Time and Dosage	
	Yapraktan Uygulama / Application by Sprey	Salma / Damlamadan / Without Dripping
Sebzelerde : Domates, Salatalık, Biber, Patlıcan, Fasulye, Kavun, Karpuz vs. Vegetables : Tomato, Cucumber, Pepper, Eggplant, Beans, Melon, Watermelon vs.	200-300 cc/100 lt su (Yapraktan uygulama ile)	350 cc /da (Damlama sulama ile)
Tarla Bitkilerinde: Pamuk, Mısır, Hububat, Ayçiçeği vs. In Field Crops: Cotton, Corn, Cereals, Sunflower etc.	200-300 cc/100 lt su (Yapraktan uygulama ile)	350 cc /da (Damlama sulama ile) 350 cc /da (Salma sulama ile)
Meyve Ağaçlarında: Yumuşak ve taş çekirdekli meyve ağaçları, Narenciye, Bağ, Zeytin, Fındık, Muz vs. In Fruit Trees: Soft and stone stone fruit trees, Citrus, Vineyard, Olive, Hazelnut, Banana vs.	200-300 cc/100 lt su (Yapraktan uygulama ile)	350 cc /da (Damlama sulama ile) 350 cc /da (Salma sulama ile)

ÖZELLİKLERİ

- İçeriğindeki serbest aminoasitler sayesinde klorofil oluşumunu arttırdığı ve vejetatif büyümeyi teşvik ettiği için fotosentezi aktive eder. Verimi yükseltir.
- Topraktan ve yapraktan uygulamada bitkide ve meyvede istenilen doku sertliğini sağlar, çiçek dökümünü azaltır, meyvelerin kalitesini ve raf ömrünü uzatır.
- Etilen oluşum döngüsüne girerek meyve olgunlaşmasını hızlandırır ve erken verimde rol oynar.
- İçeriğinde bulunan aminoasitler stres koşullarına karşı dayanıklılığı artırır.
- Bitkinin hastalıklara karşı toleransını artırır.
- Bitki besin elementlerinin bitki tarafından alınımını artırır.
- Yüksek organik madde içeriği sayesinde toprağın bünyesini zenginleştirir. Bitkilerde kılcal kök atımını sağlar.

FEATURES

- Thanks to the free amino acids it contains, it activates photosynthesis as it increases chlorophyll formation and encourages vegetative growth. It increases yield.
- In soil and foliar application, it provides the desired tissue hardness in plants and fruits, reduces flower drop, and extends the quality and shelf life of fruits.
- Ethylene enters the ethylene formation cycle, accelerating fruit ripening and playing a role in early yield.
- The amino acids it contains increase resistance to stress conditions.
- It increases the plant's tolerance to diseases.
- It increases the uptake of plant nutrients by the plant.
- Thanks to its high organic matter content, it enriches the soil structure. It provides capillary root development in plants.



Ambalaj | Package



TERRAVEG

Bitkisel Menşeli Amino Asit İçeren
Sıvı Organik Gübre

Liquid Organic Fertilizer Of Animal
Based Aminoacid

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	% 45
Organik Karbon	% 20
Organik Azot (N)	% 4
Serbest Aminoasitler	% 12
pH	4 - 6
GUARANTEED CONTENT	%W/W
Organic Substance	% 45
Organic Carbon	% 20
Organic Nitrogen (N)	% 4
Free Amino Acids	% 12
pH	4 - 6


Ürün / Product	Uygulama Zamanı ve Dozu / Application Time and Dosage	
	Yapraktan Uygulama / Application by Spray	Salma / Damlamadan / Without Dripping
Sebzelerde : Domates, Salatalık, Biber, Patlıcan, Fasulye, Kavun, Karpuz vs. Vegetables : Tomato, Cucumber, Pepper, Eggplant, Beans, Melon, Watermelon vs.	200-300 cc/100 lt su (Yapraktan uygulama ile) 200-300 cc/100 lt water (With foliar application)	350 cc /da (Damlama sulama ile) 350 cc/da (With drip irrigation)
Tarla Bitkilerinde: Pamuk, Mısır, Hububat, Ayçiçeği vs. In Field Crops: Cotton, Corn, Cereals, Sunflower etc.	200-300 cc/100 lt su (Yapraktan uygulama ile) 200-300 cc/100 lt water (With foliar application)	350 cc /da (Damlama sulama ile) 350 cc /da (Salma sulama ile) 350 cc/da (With drip irrigation) 350 cc/da (with flood irrigation)
Meyve Ağaçlarında: Yumuşak ve taş çekirdekli meyve ağaçları, Narenciye, Bağ, Zeytin, Fındık, Muz vs. In Fruit Trees: Soft and stone stone fruit trees, Citrus, Vineyard, Olive, Hazelnut, Banana vs.	200-300 cc/100 lt su (Yapraktan uygulama ile) 200-300 cc/100 lt water (With foliar application)	350 cc /da (Damlama sulama ile) 350 cc /da (Salma sulama ile) 350 cc/da (With drip irrigation) 350 cc/da (with flood irrigation)

ÖZELLİKLERİ

- Bitkilerdeki fizyolojik faaliyetlerin optimum seviyede düzenleyecek gerekli enzim ve aktivatörlerin kolayca salgılanmasını sağlar.
- Meyve sayısını, kalitesini ve yeni dallanmaları artırır. Verimi artırır.
- Birlikte kullanıldığı bitki besin elementlerinin bitki bünyesine girişini kolaylaştırarak alımına yardımcı olur.
- Ağır metal, sodyum ve klor içermez.
- İçeriğindeki serbest amino asitler ve peptitler sayesinde; klorofil sentezi ve şelatlayıcı (mikro besin elementleri üzerinde kenetlenme) etkisiyle, bitkinin vejetatif ve generatif gelişiminde rol oynar.
- Meyvelerde depo dayanıklılığını artırır.
- Dengeli bir organik azot ve organik karbon kaynağıdır.
- Olumsuz koşullarda bitki gelişiminin optimum seviyede devam etmesini sağlar.

FEATURES

- Provides easy secretion of enzymes and activators necessary for optimum regulation of physiological activities in plants.
- It Increases amount and quality of fruits; increases new branches and the yield.
- It helps the intake of plant nutrients by facilitating their entry into the plant body.
- Free of heavy metals, sodium and chlorine.
- Thanks to the free amino acids and peptides in its content; it plays a role in the vegetative and generative development of the plant, with its chlorophyll synthesis and chelating effect (docking on micronutrients).
- It increases the storage endurance of fruits.
- It is a balanced source of organic nitrogen and organic carbon.
- It ensures that the development of the plant continues at the optimum level in even adverse conditions.



Ambalaj | Package





Rootello

EC FERTİLİZER

Sıvı Haldeki Humikasit
Liquid Humicacid

Garanti Edilen İçerik

%W/W

Toplam Organik Madde	% 15
Toplam Humikasit+Fulvik Asit	% 15
pH	9

GUARANTEED CONTENT

%W/W

Total Organic Matter	% 15
Total Humicacid+Fulvic Acid	% 15
pH	9

Ürün / Product

Uygulama Zamanı ve Dozu / Application Time and Dosage

Topraktan Uygulama / Application by Drip

Yapraktan Uygulama / Dose by Spray



Şeker Pancarı, Kırmızı Pancar Sugar Beet, Red Beet	1 - Geniş toprak uygulaması :Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 400 cc. 2 - Sıravari - şerit uygulaması : Ekimi takiben dekara 200 cc. 1 - Large soil application: After the soil is prepared for planting, apply per decare. 400cc. 2 - Sıravari - strip application: 200 cc per decare following planting.	Birinci uygulama ekimden 10-12 hafta sonra dekara 200 cc. dozda; İkinci uygulama aynı dozda birinciden 2-3 hafta sonra The first application is 200 cc per decare, 10-12 weeks after planting, in dose; The second application is 2-3 weeks after the first at the same dose.
Diğer Yumruklu Bitkiler (Patates, Havuç, Soğan vs) Other Tuberous Plants (Potato, Carrot, Onion etc.)	1 - Geniş toprak uygulaması: Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 400 cc. 2 - Sıravari - şerit uygulaması: Ekimi takiben dekara 200 cc. 1 - Wide soil application:After the soil is prepared for planting, 400 cc per decare. 2 - Sıravari - strip application: 200 cc per decare following planting.	Bitkiler 20-25 cm yüksekliğe erişince dekara 50 cc, 15-20 gün sonra 2. uygulama yapılır. When the plants reach a height of 20-25 cm, 50 cc per decare, The second application is made after 15-20 days.
Tarla Bitkileri: Pamuk, Mısır, Hububat, Ayçiçeği vs. Sebze : Domates, Salatalık, Biber, Patlıcan, Fasulye, Kavun, Karpuz vs. Field Crops: Cotton, Corn, Cereals, Sunflower etc. Vegetable: Tomato, Cucumber, Pepper, Eggplant, Beans, Melon, Watermelon etc.	Geniş toprak uygulaması ve Sıravari-şerit uygulaması yukarıdaki gibidir. Damla veya sulama suyuna da dekara 250 cc hesabı ile kullanılır. Sezon boyunca 5-6 kez tekrarlanır. Şaşırtılan ürünlerde, fidelerin, şaşırtılması esnasında 100 Lt can suyuna 200 cc dozda katılarak fidelere verilir. Seralarda damla sulamada dekara 500 cc dozda 1 ay ara ile 2-3 defa uygulanır. Broad soil application and Sıravari-strip application are as above. Drop or it is used in irrigation water at the rate of 250 cc per decare. 5-6 during the season is repeated times. For transplanted crops, the seedlings lose 100 Lt of life during the transplanting process. It is added to the water in a dose of 200 cc and given to the seedlings. Drip irrigation in greenhouses It is applied 2-3 times with 1 month intervals at a dose of 500 cc per decare.	Bitkiler 20-25 cm boya erişince dekara 50 cc dozda tek başına veya yaprak gübrelere, bitki gelişim düzenleyicileri ve pestisitlere aynı dozda katılarak kullanılır. Gerekirse 20 gün sonra aynı dozda tekrarlanır. When the plants reach 20-25 cm height, apply alone or on leaves at a dose of 50 cc per decare. By adding fertilizers, plant growth regulators and pesticides at the same dose. Is used. If necessary, repeat at the same dose after 20 days.
Meyve Bahçeleri : Yumuşak ve taş çekirdekli meyve ağaçları, Narenciye, Bağ, Zeytin, Fındık, Muz vs. Orchards: Soft and stone core fruit trees, Citrus, Vineyard, Olive, Hazelnut, Banana etc.	Vejetatif gelişme başlayınca 10 Lt suya 50 cc karıştırılarak ağaç başına ağaç başı izdüşümüne gelecek şekilde toprağa verilir veya sıvı gübreler, damlama sulama veya sulama suyuna katılarak 250 cc-1lt dozda uygulanır. When vegetative development begins, 50 cc of water is mixed into 10 liters of water per tree. It is applied to the soil in line with the crown projection or liquid fertilizers, dripping It is applied in a dose of 250 cc-1lt by adding it to irrigation or irrigation water.	Yaprak gübrelere, bitki gelişim düzenleyicileri veya pestisitlere, 100 Lt suya 50 cc dozunda katılarak onların uygulamaları esnasında doğrudan yapraklara pülverize edilir. Foliar fertilizers, plant growth regulators or by adding pesticides at a dose of 50 cc to 100 liters of water. Directly to the leaves during their application. Is pulverized.

ÖZELLİKLERİ

- Bitkilerde kök gelişimini teşvik eder.
- İçeriğindeki organik madde sayesinde, topraktaki mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar.
- Humik ve fulvik asit ,topraktaki katyon alışverişini sağlayarak, bitki besin elementlerinin kök bölgesinde kalmasını sağlayarak, kök gelişimini artırır.
- Bitkilerde kılcal ve kazık kök gelişimini artırır.

FEATURES

- It promotes root development in plants.
- Thanks to the organic matter it contains, the soil It increases the activities of microorganisms.
- Humic and fulvic acid stimulate cation exchange in the soil. It increases root development by ensuring that plant nutrients remain in the root zone.
- It increases capillary and tap root development in plants.



Ambalaj | Package





Bloomax

EC FERTILIZER

NP'li Sıvı Organomineral
NP Liquid Organomineral

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Organik Madde	% 20
Serbest Aminoasit	% 3
Toplam Fosfor Pentaoksit (N)	% 5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 10
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,05
Suda Çözünür Bor (B)	%1
pH	4 - 6

GUARANTEED CONTENT	%W/W
Organic Matter	% 20
Free Amino Acid	% 3
Total Phosphorus Pentaoxide (N)	% 5
Water Soluble Manganese (Mn)	% 5
Water Soluble Zinc (Zn)	% 10
Water Soluble Molybdenum (Mo)	%0,05
Water Soluble Boron (B)	%1
pH	4 - 6


Ürün / Product	Uygulama Zamanı ve Dozu / Application Time and Dosage		
	Toprakтан Uygulama / Application by Drip		
Narenciye (Portakal, Mandalina, Limon, Greyfurt) CITRUS (orange, tangerine, lemon, grapefruit)	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva, şeftali, Kayısı, Vişne, Erik, Nar, Kivi, İncir, vb.) FRUIT TREES (Apples, Pears, Quinces, Peaches, Apricots, Cherries, Plums, Pomegranates, Kiwifruit, Figs, etc.)	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Meyve Fidanları / Fruit young trees	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Bağ / Vineyard	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Antep Fıstığı ve Fındık / Nut	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Zeytin / Olive	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Muz / Banana	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Cilek / Strawberry	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Sebzeler (Domates, Biber, Hiyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Havuç, Kabak, Marul, Fasulye, Karnabahar, Lahana, Soğan vb.) VEGETABLES (Tomatoes, Peppers, Cucumbers, Eggplants, Melons, Watermelons, Carrots, Zucchini, Lettuce, Beans, Cauliflower, Cabbage, Onions, etc.)	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Kesme Çiçeklik / Cut flower	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Yer Fıstığı / Peanut	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr
Patates / Potato	İhtiyaç duyulan her dönemde	In any period when it is considered necessary	200 gr

ÖZELLİKLERİ

- ✦ Polen miktarını ve kalitesini artırır.
- ✦ Bünyesindeki serbest aminoasitler sayesinde döllemeyi ve buna bağlı olarak verimin artmasını sağlar aynı zamanda bitkinin kök gelişimini sağlar.
- ✦ İçeriğinde bulunan fosfor çiçeklenme, tohum ve meyve oluşumunda önemli rol oynar.
- ✦ Stres koşullarında (sıcak-soğuk) çiçek oluşumu, çiçek tutumu, meyve tutumu ve meyve kalitesini artırır.

FEATURES

- ✦ It increases the amount and quality of pollen.
- ✦ Thanks to the free amino acids it contains It ensures fertilization and therefore increased productivity and also ensures the root development of the plant.
- ✦ The phosphorus it contains plays an important role in flowering, seed and fruit formation.
- ✦ It increases flower formation, flower set, fruit set and fruit quality under stress conditions (hot-cold).



400 gr

Ambalaj | Package



NATURACIT





EC FERTILIZER

Sıvı Organik Gübre
Liquid Organic Fertilizer


Ürün / Product	Uygulama Dönemi / Application Period		Uygulama Dozu / Dose by Spray
Pamuk Cotton	İlk çıkıştan itibaren	From the first release	250cc/100 lt su
Mercimek Lentil	İlk çıkıştan itibaren	From the first release	250cc/100 lt su
Hububat Cereals	İlk çıkıştan itibaren	From the first release	250cc/100 lt su
Kayısı, Şeftali Apricot, Peach	Çiçeklenmeden hemen sonra	Immediately after flowering	250cc/100 lt su
Antep Fıstığı Pistachios	Çiçeklenmeden hemen sonra	Immediately after flowering	250cc/100 lt su
Bağ Bond	İlk yaprak oluşumundan sonra	After the first leaf formation	250cc/100 lt su
Mısır Sweetcorn	İlk çıkıştan itibaren	From the first release	250cc/100 lt su
Yer Fıstığı Peanut	İlk çıkıştan itibaren	From the first release	250cc/100 lt su
Domates, Biber Tomato pepper	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Hıyar, Patlıcan Cucumber, Eggplant	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Lahana, Brokoli Cabbage, Broccoli	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Karnabahar Cauliflower	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Fasülye, Kolza Beans, Rapeseed	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Kavun, Karpuz, Kabak vb. Melon, Watermelon, Pumpkin etc.	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Şeker Pancarı Sugar beet	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Süs Bitkileri, Kesme Çiçekçilik Ornamental Plants, Cut Flowers	Çiçeklenme öncesi ve sonrasında	Before and after flowering	250cc/100 lt su
Meyve Fidanları Fruit Saplings	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Narenciye Citrus	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Muz, Kivi, Çilek Banana, Kiwi, Strawberry	Çiçeklenme döneminde	During flowering	250cc/100 lt su
Elma, Armut, Erik, Kiraz vb. Apple, Pear, Plum, Cherry etc.	Çiçeklenmeden hemen sonra	Immediately after flowering	250cc/100 lt su
Zeytin Olives	Çiçeklenmeden hemen sonra	Immediately after flowering	250cc/100 lt su

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	% 15
Organik Karbon	% 10
pH	4 - 6
GUARANTEED CONTENT	%W/W
Organic Substance	% 15
Organic Carbon	% 10
pH	4 - 6



Ambalaj | Package





VELOX

Adjuvant

Leaf Adjuvant

Garanti Edilen İçerik

Naniyonik Sürfektan Karışımı

GUARANTEED CONTENT

Nonionic Surfactant Mix

Ürün / Product

Uygulama Zamanı ve Dozu / Application Time and Dosage

Yapraktan Uygulama / Dose by Spray

Sebzelerde :
Domates, Salatalık,
Biber, Soğan,
Çilek vs.

In vegetables:
Tomato, Cucumber,
Pepper, Onion,
Strawberry etc.

100 cc / 100 lt su
100 cc / 100 lt water

Tarla Bitkilerinde:
Pamuk, Mısır, Hububat,
Ayçiçeği, Şeker Pancarı vs.

In Field Crops:
Cotton, Corn, Cereals,
Sunflower, Sugar Beet etc.

100 cc / 100 lt su
100 cc / 100 lt water

Meyve Ağaçlarında:
Elma, Armut, Kiraz
Bağ, Zeytin, Fındık,
Antep Fıstığı, Kayısı,
Şeftali vs.

In Fruit Trees:
Apple, Pear, Cherry
Vineyard, Olive,
Hazelnut, Pistachios,
Apricots, Peach vs.



100 cc / 100 lt su
100 cc / 100 lt water

ÖZELLİKLERİ

- Yüzey gerilimini azaltır. Bitki yüzeyinde yüksek yayılım sağlar.
- Kullanılan ilaç ve gübrelerden daha fazla performans alınmasını sağlar.
- Uygulamadan sonra yağın yağmurdan etkilenmez.
- Yağmurlu ve kapalı havalarda uygulandığında da, bitki yüzeyinin kurumasını sağlayarak, bitkinin hastalık etmenlerinden korunmasını sağlar.
- Bitki yüzeyini maksimum seviyede kaplayarak, çiğ oluşumunu engeller.
- Stomaları tıkamaz.

FEATURES

- It reduces surface tension. It provides high dispersion on the plant surface.
- More than the pesticides and fertilizers used ensures performance.
- It ensure greater performance from the pesticides and fertilizers used.
- When applied in rainy and overcast weather, it ensures the drying of the plant surface and protects the plant from disease factors.
- Prevent dew formation by coverinh the plant surface at the maximum level.
- It does not block stomas.



Ambalaj | Package





TERRA FORM

Toprak Adjuvantı

Soil Adjuvant

Garanti Edilen İçerik

Naniyonik Sürfektan Karışımı

GUARANTEED CONTENT

Nonionic Surfactant Mix

Ürün / Product

Uygulama Zamanı ve Dozu / Application Time and Dosage

Topraktan Uygulama / Application by Drip

Sebzeler ve Tahıllar
Vegetables and Cereals

1 lt / da
(Sezon boyunca 3 hafta arayla 2 uygulama)

1 lt / da
(2 Applications with 3 weeks intervals
during the season)

Meyve Bahçeleri
Fruit Gardens

1 lt / da
(Sezon boyunca 3 hafta arayla 2 uygulama)


1 lt / da
(2 Applications with 3 weeks intervals
during the season)

ÖZELLİKLERİ

- ❖ Farklı tipteki toprak yapısını optimize ederek üretilen ürünlerden maksimum verim almanızı sağlar.
- ❖ Suyun kök bölgesinde yanal yayılımını sağlar.
- ❖ Kılcal kök gelişimini artırır.
- ❖ Kök bölgesindeki gübre ve ilaçlardan yüksek performans alınmasını sağlar.
- ❖ Mikrobiyal aktivitenin artmasını sağlar.
- ❖ Topraktaki Aşırı suyu drene eder.
- ❖ Su tutmayan topraklarda Suyun yanal yayılımını sağlayarak , suyun kök bölgesinde kalmasını sağlar.

FEATURES

- ❖ It allows you to get maximum efficiency from the products produced by optimizing the structure of different types of soil.
- ❖ It ensures lateral diffusion of water in the root area.
- ❖ It increases capillary root development.
- ❖ High levels of fertilizer and pesticides in the root zone ensures performance.
- ❖ It increases microbial activity.
- ❖ It drains excess water in the soil.
- ❖ It ensures lateral diffusion of water in soils that do not retain water and ensures that water remains in the root zone.



Ambalaj | Package



”

iz

Bırakan Çözümler





TERRAMAY

GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAKLIĞI!



www.terramay.com.tr



TERRAMAY

www.terramay.com.tr



 /terramay.tarim

 /terramay



+90 536 250 69 92
+90 (242) 502 41 07



info@terramay.com.tr



www.terramay.com.tr



Yenigün Mah. Kızılırmak Cad. Ali Peçen
Plaza A1 Giriş No:22/1 İç Kapı No:403
Muratpaşa / ANTALYA